Este cartão de lembrete contém informações importantes de segurança que você deve conhecer antes de iniciar e durante o tratamento com injeções de denosumabe (XGEVA) para condições relacionadas ao câncer.

Seu médico recomendou que você receba injeções de denosumabe (XGEVA) para ajudar a prevenir complicações ósseas (por exemplo, fraturas) causadas por metástases ósseas ou cânceres ósseos.

Um efeito colateral chamado osteonecrose da mandíbula (ONM, dano ósseo na mandíbula) foi relatado com frequência (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas) em pacientes que recebem injeções de denosumabe (XGEVA) para condições relacionadas ao câncer. A ONM também pode ocorrer após a interrupção do tratamento.

É importante tentar prevenir o desenvolvimento de ONM, pois ela pode ser uma condição dolorosa e difícil de tratar. Para reduzir o risco de desenvolver ONM, há algumas precauções que você deve tomar:

Antes de iniciar o tratamento:

- Verifique com seu médico se é recomendado realizar um exame odontológico antes de iniciar o tratamento com denosumabe (XGEVA).
- Informe seu médico/enfermeiro (profissional de saúde) se você tiver qualquer problema na boca ou nos dentes.

Pacientes que passam por cirurgia odontológica (por exemplo, extrações dentárias), que não recebem cuidados odontológicos de rotina ou têm doença gengival, são fumantes ou recebem diferentes tipos de tratamentos contra o câncer podem apresentar maior risco de desenvolver ONM.

Durante o tratamento:

- Você deve manter uma boa higiene oral e realizar consultas odontológicas de rotina. Se usar próteses dentárias, certifique-se de que elas estejam bem ajustadas.

- Se você estiver em tratamento odontológico ou for passar por cirurgia odontológica (por exemplo, extrações dentárias), informe seu médico e diga ao seu dentista que você está em tratamento com denosumabe (XGEVA).

- Entre em contato imediatamente com seu médico e dentista se apresentar qualquer problema na boca ou nos dentes, como dentes soltos, dor ou inchaço, feridas que não cicatrizam ou secreção, pois esses podem ser sinais de ONM.

Leia a bula que acompanha seu medicamento para obter mais informações.